

婦人

No.	名称	1サイクル	薬剤名	投与量	投与日
53-001	BEP	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン プレオマイシン エトポシド シスプラチン	6.6 mg 3 mg 20 mg/m ² (最大30 mg/body) 100 mg/m ² 20 mg/m ²	d1-5 d1-5 d2,9,16 d1-5 d1-5
53-002	3w-DOC+CBDCA	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント ドセタキセル カルボプラチン	6.6 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 60~75 mg/m ² AUC 5~6	d1 d1 d1~3 d1 d1
53-003	3w-PTX+CBDCA	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン	19.8 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 175~180 mg/m ² AUC 5~6	d1 d1 d1~3 d1 d1
53-005	w-PTX	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル	8.25 mg 3 mg 60~80 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15
53-006	w-PTX+w-CBDCA	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル カルボプラチン	8.25 mg 3 mg 75~80 mg/m ² AUC 1.5~2	d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15
53-007	CPT-11+NDP	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ネダプラチン イリノテカン	6.6 mg 3 mg 60 mg/m ² 60 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15 d1 d1,8,15
53-008	MEA	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン メトレキサート メトレキサート アクチノマイシンD エトポシド	6.6 mg 3 mg 150 mg/body(ワンショット) 300 mg/body 0.5 mg/body 15 mg/body	d1-5 d1-5 d1 d1 d1-5 d1-5
53-011	CPT-11+CDDP	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン イリノテカン シスプラチン	3.3 mg 3 mg 50-60 mg/m ² 30 mg/m ²	d1,15 d1,15 d1,15 d1,15
53-013	CPT-11	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン イリノテカン	6.6 mg 3 mg 100 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15
53-014	PLD	1q=4w	デキサメタゾン注 ドキソビリン リホソーム製剤	8.25 mg 40~50 mg/m ²	d1 d1
53-016	3w-DOC	1q=3~4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ドセタキセル	6.6 mg 3 mg 60~75 mg/m ²	d1 d1 d1

53-017	CPT-P	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント イリノテカン シスプラチン	6.6 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 60 mg/m ² 60 mg/m ²	d1~3,8,15 d1~3,8,15 d1~3 d1,8,15 d1,8,15
53-018	NDP	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント ネダプラチン	6.6 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 80 mg/m ²	d1 d1 d1~3 d1
53-019	GEM	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ゲムシタビン	6.6 mg 3 mg 1000 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15
53-020	PLD+CBDCA	1q=4w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント ドキシソルビシン カルボプラチン	8.25 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 30 mg/m ² ACU 5	d1 d1 d1~3 d1 d1
53-021	NGT	1q=3w	デキサメタゾン注 ノギテカン	6.6 mg 1.5 mg/m ²	d1-5 d1-5
53-022	GEM+DOC	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 グラニセトロン ゲムシタビン ドセタキセル	6.6 mg 3 mg 900 mg/m ² 70 mg/m ²	d1,8 d1,8 d1,8 d1
53-023	w-CDDP+RT	1q=7d	デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント シスプラチン	6.6 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 40 mg/m ² (max.70 mg/week)	d1 d1 d1~3 d1
53-024	3w-CDDP+RT	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント シスプラチン	6.6 mg 9.9 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 70 mg/m ²	d1 d2,3 d1 d1~3 d1
53-025	dd-PTX+CBDCA	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン グラニセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン	8.25 mg 0.75 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 80 mg/m ² AUC 5~6	d1,8,15 d1 d8,15 d1~3 d1,8,15 d1
53-028	conventional MTX	1q=2w	メトトレキサート	0.4 mg/kg	d1-5
53-030	dd-PTX+CBDCA+BEV	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン グラニセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	8.25 mg 0.75 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 80 mg/m ² AUC 5~6 15 mg/kg	d1,8,15 d1 d8,15 d1~3 d1,8,15 d1 d1

53-031	PLD+BEV(卵巣)	1q=3~4w	デキサメタゾン注 トキソピリン リホソーム製剤 ベバシズマブ	8.25 mg 30~40 mg/m ² (30mg/m ² は間隔3週、40 mg/m ² は間隔4週) 15 mg/kg	d1 d1 d1
53-032	3w-PTX+CBDCA+BEV	1q=3~4w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	19.8 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 175~180 mg/m ² AUC 5~6 15 mg/kg	d1 d1 d1~3 d1 d1 d1
53-033	3w-PTX+CBDCA(減感作)	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン	19.8 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 175~180 mg/m ² AUC 5~6	d1 d1 d1~3 d1 d1
53-034	dd-PTX+CBDCA(減感作)	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 パロノセトロン グラニセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン	16.5 mg 8.25 mg 0.75 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 80 mg/m ² AUC 5~6	d1 d8,15 d1 d8,15 d1~3 d1,8,15 d1
53-036	BEV	1q=3w	ベバシズマブ	15 mg/kg	d1
53-037	3w-PTX+CBDCA(減感作)+BEV	1q=3~4w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	16.5 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 175~180 mg/m ² AUC 5~6 15 mg/kg	d1 d1 d1~3 d1 d1 d1
53-038	GEM+CBDCA	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン グラニセトロン アプレピタント カルボプラチン ゲムシタビン	6.6 mg 0.75 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg AUC 4 1000 mg/m ²	d1,8 d1 d8 d1~3 d1,8 d1
53-039	GEM+CBDCA+BEV	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン グラニセトロン アプレピタント カルボプラチン ゲムシタビン ベバシズマブ	6.6 mg 0.75 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg AUC 4 1000 mg/m ² 15 mg/kg	d1,8 d1 d8 d1~3 d1,8 d1 d1
53-040	W-PTX+BEV	1q=3~4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル ベバシズマブ	8.25 mg 3 mg 80 mg/m ² 15 mg/kg	d1,8,15,(22) d1,8,15,(22) d1,8,15,(22) d1,8,15,(22)
53-041	ACD	1q=2w	デキサメタゾン注 グラニセトロン アクチノマイシンD	6.6 mg 3 mg 10 µg/kg	d1-5 d1-5 d1-5

53-042	GEM+CBDCA (CBDCA減感作)	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 パロノセトロン グラニセトロン アプレピタント カルボプラチン ゲムシタビン ベバシズマブ	16.5 mg 6.6 mg 0.75 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg AUC 4 1000 mg/m ² 15 mg/kg	d1 d8 d1 d8 d1~3 d1,8 d1 d1
53-046	PLD+CBDCA+BEV	1q=4w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント ドキシソルビシン カルボプラチン ベバシズマブ	8.25 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 30 mg/m ² ACU 5 15 mg/kg	d1 d1 d1~3 d1 d1 d1
53-047	CPT-11+CDDP (卵巣) (減感作)	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント イリノテカン シスプラチン	19.8 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 50-60 mg/m ² 30 mg/m ²	d1,15 d1,15 d1~3, 15~17 d1,15 d1,15
18-003	AP療法	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント ドキシソルビシン シスプラチン	9.9 mg 6.6 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 60 mg/m ² 50 mg/m ²	d1 d2~3 d1 d1~3 d1 d1
18-023	TP	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル シスプラチン	19.8 mg 6.6 mg 3 mg 135 mg/m ² 50 mg/m ²	d1 d2~6 d2 d1 d2