

## 2019年度 有所見率

### 【肥満度判定】


男性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	349	433	450	393	285	224	2134
要経過観察・注意	61	203	425	506	460	321	1976
要治療(含治療中)							
要再・精密検査							
合計	410	636	875	899	745	545	4110


女性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	1154	1095	1299	1123	672	276	5619
要経過観察・注意	96	137	222	239	156	82	932
要治療(含治療中)							
要再・精密検査	1		1				2
合計	1251	1232	1522	1362	828	358	6553

肥満度判定(男性)



肥満度判定(女性)



肥満: 有所見率は男性で女性より高い。男性は60歳代で最も高いが、女性は年齢とともに徐々に高くなる。

### 【血圧判定】


男性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	385	573	702	578	368	217	2823
要経過観察・注意	23	58	122	167	156	90	616
要治療(含治療中)		4	50	151	224	243	672
要再・精密検査	1	1	2	5	2	3	14
合計	409	636	876	901	750	553	4125


女性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	1241	1206	1442	1157	585	186	5817
要経過観察・注意	12	31	101	153	152	88	537
要治療(含治療中)	1	4	24	100	128	112	369
要再・精密検査		1		5	5	5	16
合計	1254	1242	1567	1415	870	391	6739

血圧判定(男性)



血圧判定(女性)



血圧: 有所見率は男女とも年齢とともに高くなり、男性が女性より高い。

## 【糖代謝判定】


男性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	372	578	716	643	437	268	3014
要経過観察・注意	31	36	98	149	186	165	665
要治療(含治療中)	2	3	21	80	95	99	300
要再・精密検査		2	19	25	24	10	80
合計	405	619	854	897	742	542	4059


女性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	1051	1130	1373	1121	579	199	5453
要経過観察・注意	131	78	117	193	184	113	816
要治療(含治療中)	2	5	7	16	56	31	117
要再・精密検査	5	2	8	16	8	10	49
合計	1189	1215	1505	1346	827	353	6435

糖代謝判定(男性)



糖代謝判定(女性)



糖代謝: 有所見率の分布は男女で同じ傾向で30歳以降で年齢とともに高くなる。

## 【コレステロール代謝判定】


男性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	349	461	490	490	373	282	2445
要経過観察・注意	52	141	289	288	208	109	1087
要治療(含治療中)	2	6	51	89	151	147	446
要再・精密検査	2	11	24	30	10	4	81
合計	405	619	854	897	742	542	4059


女性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	1102	1062	1148	661	324	131	4428
要経過観察・注意	82	144	327	564	330	124	1571
要治療(含治療中)	2	6	18	86	147	87	346
要再・精密検査	3	3	12	35	26	11	90
合計	1189	1215	1505	1346	827	353	6435

コレステロール代謝判定(男性)



コレステロール代謝判定(女性)



コレステロール代謝: 有所見率は男性では30～60歳代にかけて徐々に高くなる。女性では年齢とともに高くなり、50歳代で男性の有所見率を超える。

### 【中性脂肪判定】


男性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	357	507	659	691	567	447	3228
要経過観察・注意	46	106	172	173	134	65	696
要治療(含治療中)			8	18	33	30	89
要再・精密検査	2	6	15	15	8		46
合計	405	619	854	897	742	542	4059


女性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	1128	1171	1418	1233	738	310	5998
要経過観察・注意	60	42	85	102	73	24	386
要治療(含治療中)		1	1	9	16	18	45
要再・精密検査	1	1	1	2		1	6
合計	1189	1215	1505	1346	827	353	6435

中性脂肪判定(男性)



中性脂肪判定(女性)



中性脂肪: 有所見率は男性で女性より高い。男性は40～60歳代で高いが、女性は年齢とともに徐々に高くなる。

### 【尿酸代謝判定】


男性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	193	414	586	613	510	376	2692
要経過観察・注意	29	101	170	156	106	69	631
要治療(含治療中)	1	7	28	64	87	90	277
要再・精密検査	2	9	19	14	5	3	52
合計	225	531	803	847	708	538	3652


女性

	20代	30代	40代	50代	60代	70～	計
異常なし・放置可	197	863	1198	1108	696	318	4380
要経過観察・注意	2	1	17	31	22	16	89
要治療(含治療中)			1	1	3	3	8
要再・精密検査		1	1		2		4
合計	199	865	1217	1140	723	337	4481

尿酸判定(男性)



尿酸判定(女性)



尿酸: 有所見率は女性で低く、全年齢で10%未満である。

【その他】

	血算・血液像検査	尿検査	肝機能検査
異常なし・放置可	8931 [86.7%]	6701 [63.1%]	8876 [84.2%]
要経過観察・注意	974 [9.5%]	2863 [27.0%]	1324 [12.6%]
要治療(含治療中)	123 [1.2%]	160 [1.5%]	56 [0.5%]
要再・精密検査	271 [2.6%]	891 [8.4%]	284 [2.7%]
合計	10299	10615	10540

	呼吸器系判定*1	上部消化管判定*2	腹部超音波検査
異常なし・放置可	7568 [72.1%]	3487 [49.7%]	1828 [31.5%]
要経過観察・注意	2376 [22.6%]	3088 [44.0%]	3659 [63.0%]
要治療(含治療中)	225 [2.1%]	176 [2.5%]	150 [2.6%]
要再・精密検査	338 [3.2%]	270 [3.8%]	171 [2.9%]
合計	10507	7021	5808

	心電図検査	下部消化管判定*3	総合判定
異常なし・放置可	6991 [86.0%]	6739 [92.5%]	1349 [12.4%]
要経過観察・注意	856 [10.5%]	72 [1.0%]	4906 [45.1%]
要治療(含治療中)	162 [2.0%]	32 [0.4%]	1681 [15.5%]
要再・精密検査	125 [1.5%]	441 [6.1%]	2931 [27.0%]
合計	8134	7284	10867

\*1: 胸部単純X線検査、胸部CT検査、肺機能検査、喀痰細胞診を含む

\*2: 上部消化管内視鏡検査、胃X線検査、ペプシノーゲン判定、ピロリ菌検査を含む

\*3: 便潜血反応検査、大腸内視鏡検査を含む

注: 有所見率は宿泊ドック(一泊PETドックを含む)、一日ドック(プレミアムドック、PETドックを含む)、半日ドック、レディースドック、事業所健診(特定健診を含む)、職員健診、ボランティア健診受診者における当該検査の判定結果を集計したものです。