

| 月日(日時) | / ~ / | / | / | / | / ~ / | / ~ / |
|---------|---|---|---|--|---|---|
| 経過(病日等) | 入院日~手術前日 | 手術前 | 手術後 | 手術後1日目 | 手術後2日目~5日目 | 手術後6日目~退院まで |
| | <ul style="list-style-type: none"> 安心して手術に臨めるように、手術の目的・内容を理解しましょう。 手術の準備をしましょう。 | <ul style="list-style-type: none"> 安心して手術に臨めるように、手術の準備をしましょう。 手術後、痛みが強い場合はお知らせください。 手術後、吐き気・手術した足の違和感など苦痛な症状がある場合はお知らせください。 | | <ul style="list-style-type: none"> 痛みや苦痛な症状がある場合はお知らせください。 血栓予防のために、足首や足の指をしっかり動かしましょう。 | <ul style="list-style-type: none"> 痛みや苦痛な症状がある場合はお知らせください。 脱臼に注意しながらリハビリを行いましょう。 血栓予防のために、足首や足の指をしっかり動かしましょう。 | <ul style="list-style-type: none"> 退院後の生活をイメージしながら、リハビリを行いましょう。 脱臼しやすい姿勢を避けましょう。 転倒に注意して動きましょう。 退院後の生活上の注意点について理解しましょう。 |
| 点滴 | | <input type="checkbox"/> 手術室に到着後、点滴が始まります。 | <ul style="list-style-type: none"> 手術後数日点滴が続きます。 抗生物質の点滴があります。 | <ul style="list-style-type: none"> 食事がしっかり食べられるようになるまで、点滴投与が続きます。 抗生物質の点滴があります。 | | |
| 薬 | <ul style="list-style-type: none"> 現在内服している薬を確認します。 血をかたまりにくくする薬がないか確認させていただきます。 内服継続の有無については、医師または看護師から説明いたします。 | <input type="checkbox"/> 現在内服中の薬は中止となります。 <input type="checkbox"/> 医師の指示にて、() 時に () を内服します。 | | <ul style="list-style-type: none"> 普段内服していた薬が再開となる予定です。看護師が説明いたします。 足に血栓ができないように、術後1週間程度、血を固まりにくくする薬の内服が始まります。 | | |
| 検査 | <ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて検査が入ることがあります。 | | <ul style="list-style-type: none"> 血液検査があります。 | <ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて検査が入ることがあります。事前に説明します。 | | |
| 処置 | <ul style="list-style-type: none"> 手術前日までに排便がない場合、夕食後に浣腸を行う場合があります。担当看護師にご相談ください。 医師が手術する側の足または手に印をつけます。 | <ul style="list-style-type: none"> 手術着に着替えて、弾性ストッキングを手術しない方の足にはきます。 下着は着用したまま行き手術室で脱ぐか、病室で脱いでから行くか選択できます。 | <ul style="list-style-type: none"> 背中から痛み止めの管が入ってくる場合があります。 足の血栓予防のためにフットポンプ(ふくらはぎのマッサージ器)をつけます。 酸素吸入を行います。 輸血を行う場合があります。 | <ul style="list-style-type: none"> 背中の痛み止めの管を抜きます。 朝、酸素吸入を終了します。 | <ul style="list-style-type: none"> 適宜、医師が創のチェックをします。 | |
| 活動安静度 | <ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。 手術に備えてゆっくりお休みください。 | <ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。 <input type="checkbox"/> 歩ける方は歩いて手術室に行きます。 <input type="checkbox"/> 車椅子又はベッドで手術室に行きます。 | <ul style="list-style-type: none"> ベッド上での安静になります。 寝返りはできます。 血栓予防のために、足首や足の指をしっかり動かしましょう。 <input type="checkbox"/> 外転枕を使用することがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> 離床が可能になります。 看護師が車椅子の移動の方法を説明しながらお手伝いします。 <input type="checkbox"/> 外転枕を使用することがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> リハビリの状況に応じて、安静度が上がっていきます。車椅子、歩行器、杖や独歩などステップアップをしていきます。看護師と一緒に確認しながら行います。 手術後は痛みがあるためうまく力が入らなかったり、ふらつきたりすることがあります。看護師が付き添いますのでナースコールでお知らせください。 <input type="checkbox"/> 外転枕を使用することがあります。 | |
| 食事 | <ul style="list-style-type: none"> 食事療法をされている方、アレルギーがある方はお知らせください。 手術前日、22時から禁食となります。 <input type="checkbox"/> 22時以降はOS-1のみ摂取可能です。OS-1 500mlを夜から朝にかけてゆっくりお飲みください。手術時間によりOS-1摂取可能時間が異なります。別紙「経口補水液(OS-1)の飲み方」で説明します。 | <input type="checkbox"/> 禁食です。 <input type="checkbox"/> () 時まで OS-1 のみ摂取可能です。 |  | <ul style="list-style-type: none"> 朝から食事が開始となります。 召し上がりやすい形態の食事を提供いたします。  | | |
| 清潔 | <ul style="list-style-type: none"> シャワー浴ができます。 手術のために身体をきれいにしましょう。必要時お手伝いします。  | <ul style="list-style-type: none"> 歯みがき・洗面は行いましょう。  | <ul style="list-style-type: none"> シャワー浴はできません。 | <ul style="list-style-type: none"> 身体を拭くための温かいタオルをお持ちします。着替えをお手伝いいたします。 | <ul style="list-style-type: none"> 手術後2日目からシャワー浴が可能です。手術後初回のシャワーについては看護師が注意事項を説明します。 ケアを行う日以外にも温かいタオルが必要な場合は看護師にお知らせください。 | |
| 排泄 | <ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。 | <ul style="list-style-type: none"> 手術前にトイレをすませてください。 | <ul style="list-style-type: none"> 手術後は尿の管が入っています。 手術後は安静のため、排便是ベッド上となりますので、ナースコールでお知らせください。 | <ul style="list-style-type: none"> 車椅子に乗れるようになったら尿の管を抜きます。 尿の管を抜いた後は、排尿の状態を観察するため尿を測ります。  | | |
| 説明生活指導 | <ul style="list-style-type: none"> 入院生活について説明いたします。 手首にリストバンドをつけます。 手術の一連の流れについて説明します。 医師から手術について説明があります。 手術に関する同意書を確認します。 手術中の顔色や爪色の確認のため、ネイルカラー・ネイルアートはすべて落としてください。 入院後、薬剤師が内服薬を確認します。 | <ul style="list-style-type: none"> 手首にリストバンドがついていることを確認してください。 「手術を安全に受けていただくためにご協力ください」に沿って確認します。 長い髪の方は飾りのないゴムで2つにむすんでください。 身につけている金属類などをはずして準備してください。(眼鏡・コンタクトレンズ・指輪・ネックレス・ピアス・時計・義歯・かつら・湿布) <input type="checkbox"/> 家族の方は病棟のラウンジでお待ちください。 <input type="checkbox"/> 家族の方はお部屋でお待ちください。 | <ul style="list-style-type: none"> 手術後は、全身状態の観察のために検温の回数が多くなります。 創部をアイスノン®で冷やします。  | <ul style="list-style-type: none"> 創部をアイスノン®で冷やします。 血栓予防の弾性ストッキングは医師の許可が出るまで手術後も履き続けます。 痛みやかゆみが出たり、皮膚が赤くなったときはお知らせください。洗濯は可能ですが、交換が必要な方は売場でご購入ください。 | <ul style="list-style-type: none"> 創部をアイスノン®で冷やします。 リハビリ室でのリハビリが始まります。お一人で行けるようになるまではご案内いたします。 脱臼しないよう手術した足を内股にしたり深くしゃがみ込む動作は避けましょう。  | <ul style="list-style-type: none"> 退院後の生活の注意事項をパンフレットで説明いたします。 |

※治療・経過については、現時点で考えられるものであり、今後検査・治療経過によって変更になる場合があります。

※入院期間については現時点で予測される期間です。