

実習・研修を受けられる方へのお願い

日本赤十字社医療センター
感染管理室

当センターで実習または研修を受けられる方は、職業感染防止の視点で下記の項目に関する証明書の提出をお願い致します。

対象者：1週間以上病院内で実習または研修を行うもの
断続的に5日以上病院内で実習または研修を行うもの

1. 流行性ウイルス感染症（麻疹、風疹、ムンプス、水痘）

最新の抗体検査結果を基準にし、下記の基準値と照らし合わせ該当する対応を行う。

抗体検査判断基準

	陰性	陰性ではない	基準を満たす
麻疹	EIA法 (IgG) 2.0未満 (陰性) 中和法 1:4未満 PA法 1:16未満	EIA法 (IgG) 2.0以上~16.0未満(±) 中和法 1:4以上~1:8未満 PA法 1:16、1:32、1:64、1:128	EIA法 (IgG) 16.0以上 中和法 1:8以上 PA法 1:256以上
風疹	EIA法 (IgG) 2.0未満 (陰性) HI法 1:8未満	EIA法 (IgG) 2.0以上~8.0未満(±) HI法 1:8~1:16	EIA法 (IgG) 8.0以上 HI法 1:32以上
水痘	IAHA法 1:2未満 EIA法 (IgG) 2.0未満 (陰性)	IAHA法 1:2~1:4 EIA法 (IgG) 2.0以上~4.0未満(±)	IAHA法 1:8以上 EIA法 (IgG) 4.0以上(陽性)
流行性耳下腺炎	EIA法 (IgG) 2.0未満 (陰性)	EIA法 (IgG) 2.0以上~4.0未満(±)	EIA法 (IgG) 4.0以上(陽性)
対応	2回接種 ワクチン接種証明書提出	1回接種 ワクチン接種証明書提出	検査結果の証明書提出のみ

<参考> 院内感染対策としてのワクチンガイドライン 日本環境感染学会 第1版 2009年

2. 結核

6か月以内の胸部XPで異常なしの証明書 または IGRA(QFT/T-spot)結果の提出
IGRA(QFT/T-spot)結果で陽性または判定保留者は、胸部XPの異常のなしの証明書の提出

3. B型肝炎

HBs抗体 10mIU/mL以上、もしくはワクチン接種済みであること。抗体価 10mIU/mL未満の場合で血液曝露時は、抗HBsヒト免疫グロブリン（血液製剤）の筋肉注射を受ける対象者となる可能性がある。

問い合わせ 03-3400-1311 (代)
感染対策室担当者

2016.11 改定