

服薬情報提供書(トレーシングレポート):がん

※はじめにお読みください※

副作用判定は必要に応じて以下の表を参考にしてください。

例)Grade 1～2 症状で緊急性がなく、次回診察への情報提供で問題が無い場合

なお、Grade 1～2 症状でも**緊急性を要すると思われる場合**や**症状が悪化した場合には受診するように指導**してください。

副作用症状Grade2の症状 (CTCAE Ver4.0)

悪心	顕著な体重減少, 脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少
嘔吐	24時間に3-5エピソードの嘔吐 (5分以上間隔が開いたものをそれぞれ1エピソードとする)
食欲不振	顕著な体重減少や栄養失調を伴わない摂食量の変化; 経口栄養剤による補充を要する
口腔粘膜炎	中等度の疼痛; 経口摂取に支障がない; 食事の変更を要する
下痢	ベースラインと比べて4-6回/日の排便回数増加; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が中等度増加
便秘	緩下剤または浣腸の定期的使用を要する持続的症狀; 身の回り以外の日常生活動作の制限
手足症候群	疼痛を伴う皮膚の変化(例: 角層剥離, 水疱, 出血, 浮腫, 角質増殖症); 身の回り以外の日常生活動作の制限
高血圧	ステージ1の高血圧(収縮期血圧140-159 mmHgまたは拡張期血圧90-99mmHg); 内科的治療を要する; 再発性または持続性
末梢神経障害	中等度の症状がある;身の回り以外の日常生活動作の制限
倦怠感	だるさ, または元気がない; 身の回り以外の日常生活動作の制限
浮腫(四肢)	四肢間の差が最も大きく見える部分で, 体積または周長の差が>10-30%; 腫脹または四肢の解剖学的構造が不明瞭になっている
皮膚障害	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限

上記以外の副作用に関してもお気づきの点があれば報告ください。

その際の評価資料として各製品の「**適正使用ガイド**」等もご考慮ください。