

肉腫

No.	名称	1サイクル	薬剤名	投与量	投与日
18-005	カルボプラチン(精巢)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセロン カルボプラチン	6.6 mg 3 mg 400 mg/m ²	d1 d1 d1
18-006	DXR	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセロン ドキシソルビシン	6.6 mg 3 mg 60 mg/m ²	d1 d1 d1
18-022	IFM	1q=3~4w	デキサメタゾン注 グラニセロン アプレピタント イホスファミド メスナ	6.6 mg 3 mg 125 mg、80 mg、80 mg 1500~3000 mg/m ² 300~600 mg/m ²	d1~5 d1~5 d1~3 d1~5 d1~5
18-045	VDC-IE(偶数コース)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセロン アプレピタント エトポシド イホスファミド メスナ	6.6 mg 3 mg 125 mg、80 mg、80 mg 100 mg/m ² 1800 mg/m ² 360 mg/m ²	d1~5 d1~5 d1~3 d1~5 d1~5 d1~5
18-045	VDC-IE(奇数コース)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセロン アプレピタント ビンクリスチン ドキシソルビシン シクロホスファミド	6.6 mg 3 mg 125 mg、80 mg、80 mg 1.5 mg/m ² (max 2mg/b) 75 mg/m ² 1200 mg/m ²	d1 d1 d1~3 d1 d1 d1
18-045	VDC-IE(11コース以降)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセロン アプレピタント ビンクリスチン アクチノマイシンD シクロホスファミド	6.6 mg 3 mg 125 mg、80 mg、80 mg 1.5 mg/m ² (max 2mg/b) 1.25 mg/m ² 1200 mg/m ²	d1 d1 d1~3 d1 d1 d1
18-049	Wilms EE4A(week 0)	1q=1w	アクチノマイシンD	1.35 mg/m ² (max 2.3mg/b) (30kg未満では0.045 mg/kg)	d1
18-049	Wilms EE4A(week 1,2,4,5,7,8,10)	1q=1w	ビンクリスチン	1.5 mg/m ² (max 2mg/b) (30kg未満では0.05 mg/kg)	d1

18-049	Wilms EE4A(week 3,6,9)	1q=1w	デキサメタゾン注 グラニセトロン アクチノマイシンD ビンクリスチン	6.6 mg 3 mg 1.35 mg/m ² (max 2.3mg/b) (30kg未満では0.045 mg/kg) 1.5 mg/m ² (max 2mg/b) (30kg未満では0.05 mg/kg)	d1 d1 d1 d1
18-049	Wilms EE4A	1q=1w	デキサメタゾン注 グラニセトロン アクチノマイシンD ビンクリスチン	6.6 mg 3 mg 1.35 mg/m ² (max 2.3mg/b) (30kg未満では0.045 mg/kg) 2.0 mg/m ² (max 2mg/b) (30kg未満では0.05 mg/kg)	d1 d1 d1 d1
18-056	トラベクテジン(悪性軟部腫瘍)	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 パロノセトロン トラベクテジン	19.8 mg 8 mg 0.75 mg 1.2 mg/m ²	d1 d2~3 d1 d1
18-057	エリブリン(悪性軟部腫瘍)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン エリブリン	6.6 mg 3 mg 1.4 mg/m ²	d1,8 d1,8 d1,8
18-059	DXR+IFM(肉腫)	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント イホスファミド アドリアマイシン メスナ	9.9 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 2000 mg/m ² 30 mg/m ² 400 mg/m ² × 3回	d1~5 d1 d1~3 d1~5 d1~2 d1~5