

### 33 大腸肛門外科

科	登録 No.	名称	1サイクル	薬剤名	投与量	投与日
33	008	m-FOLFOX6	1q=2w	グラニセトロン (外来はパロノセトロン) デキサメタゾン オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg (外来はパロノセトロン) 6.6 mg 85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> (ポンプ)	d1 (d1) d1 d1 d1 d1~2
33	009	BEV5+m-FOLFOX6	1q=2w	グラニセトロン (外来はパロノセトロン) デキサメタゾン ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg (外来はパロノセトロン) 6.6 mg 5 mg/kg 85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> (ポンプ)	d1 (d1) d1 d1 d1 d1 d1~2
33	012	BEV5+ip-FOLFIRI	1q=2w	グラニセトロン (外来はパロノセトロン) デキサメタゾン ベバシズマブ イリノテカン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg (外来はパロノセトロン) 6.6 mg 5 mg/kg 150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> (ポンプ)	d1 (d1) d1 d1 d1 d1 d1~2
33	013	GET	1q=1w	セツキシマブ	400 mg/m <sup>2</sup> (導入時) 250 mg/m <sup>2</sup> (導入後)	d1 d1

33	014	GET(毎週)+CPT-11【2週1休】	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン セツキシマブ セツキシマブ イリノテカン	3 mg 6.6 mg 400 mg/m <sup>2</sup> (導入時) 250 mg/m <sup>2</sup> (導入後) 100 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1 d1,8 d1,8
33	016	GET+FOLFIRI	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン セツキシマブ セツキシマブ イリノテカン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg 6.6 mg 400 mg/m <sup>2</sup> (導入時) 250 mg/m <sup>2</sup> (導入後) 150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 1200 mg/m <sup>2</sup>	d1,2 d1,2 d1 d1 d1 d1 d1,2
33	017	ip-FOLFIRI	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン (外来はパロ/セトロン) イリノテカン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg 6.6 mg (外来はパロ/セトロン 0.75mg) 150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> (ポンプ)	d1 d1 (d1) d1 d1 d1 d1~2
33	020	GET+ip-FOLFIRI	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン (外来はパロ/セトロン) セツキシマブ セツキシマブ イリノテカン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg 6.6 mg (外来はパロ/セトロン 0.75mg) 400 mg/m <sup>2</sup> (導入時) 250 mg/m <sup>2</sup> (導入後) 150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> (ポンプ)	d1 d1 (d1) d1 d1 d1 d1 d1~2

33	021	BEV+XELOX	1q=3w	グラニセトロン デキサメタゾン ペバシズマブ オキサリプラチン カペシタビン	3 mg 6.6 mg 7.5 mg/kg 85 mg/m <sup>2</sup> 2000mg/m <sup>2</sup> /日	d1 d1 d1 d1 d1~14
33	022	XELOX	1q=3w	グラニセトロン デキサメタゾン オキサリプラチン カペシタビン	3 mg 6.6 mg 85 mg/m <sup>2</sup> 2000mg/m <sup>2</sup> /日	d1 d1 d1 d1~14
33	023	BEV5+CPT-11+TS-1(大腸)	1q=4w	グラニセトロン デキサメタゾン ペバシズマブ イリノテカン TS-1	3 mg 6.6 mg 5 mg/kg 80 ~ 125 mg/m <sup>2</sup> 80 ~ 120 mg/b	d1,15 d1,15 d1,15 d1,15 d1~14
33	024	CET+FOLFOX4	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン セツキシマブ セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg 6.6 mg 400 mg/m <sup>2</sup> (導入時) 250 mg/m <sup>2</sup> (導入後) 85 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup>	d1,2 d1,2 d1 d1 d1 d1,2 d1,2 d1,2
33	025	CET+m-FOLFOX6	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン (外来はパロ/セトロン)セ ツキシマブ セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg 6.6 mg (外来はパロ/セトロン) 400 mg/m <sup>2</sup> (導入時) 250 mg/m <sup>2</sup> (導入後) 85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> (ポンプ)	d1 d1 (d1) d1 d1 d1 d1 d1 d1~2
33	026	PAN	1q=2w	パニツムマブ	6 mg/kg	d1

33	027	PAN+ip-FOLFIRI	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン (外来はパロ/セトロン) パニツムマブ イリノテカン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg 6.6 mg (外来はパロ/セトロン 0.75mg) 6 mg/kg 150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> (ポンプ)	d1 d1 (d1) d1 d1 d1 d1 d1~2
33	029	PAN+m-FOLFOX6	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン (外来はパロ/セトロン) パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg 6.6 mg (外来はパロ/セトロン 0.75mg) 6 mg/kg 85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> (ポンプ)	d1 d1 (d1) d1 d1 d1 d1 d1~2
33	031	SIRB	1q=3w	グラニセトロン デキサメタゾン ベバシズマブ イリノテカン TS-1	3 mg 6.6 mg 7.5 mg/kg 150 mg/m <sup>2</sup> 80 ~ 120 mg/b	d1 d1 d1 d1 d1~14
33	037	BEV+Cape	1q=3w	ベバシズマブ カペシタビン	7.5 mg/kg 2000mg/m <sup>2</sup> /日	d1 d1~14
33	038	BEV+TAS-102(大腸)	1q=4w	ベバシズマブ TAS-102	5 mg/kg 70 mg/m <sup>2</sup> /日	d1,15 d1~14